



Om de melkproductie te helpen verminderen

VOOR MELKKOEIEN BIJ HET DROOGZETTEN

Producteigenschappen: Na het droogzetten van de koe blijft er een grote hoeveelheid melk in de uier achter door het stoppen met melken, wat tot uierstuwung leidt. De resulterende toename van de druk in de uier kan pijn en ongemak bij de koe veroorzaken. Bovikalc® Dry is een oraal mineraal supplement dat wordt toegediend aan melkkoeien bij het droogzetten. Bovikalc® Dry kan de melkproductie helpen verminderen na het stoppen met melken. Verminderde melk productie vermindert de melkophoping in de uier.

Werkzaamheid: Bovikalc® Dry bevat anionische zouten, waaronder ammoniumchloride, calciumchloride en calciumsulfaat. Na orale toediening lost de bolus binnen 30 minuten op in de pens, waarna afgifte van anionische zouten en absorptie, welke invloed hebben op de zuur-base balans bij de koe. De vermindering van de melkproductie wordt verondersteld te worden bereikt door het induceren van een lichte en tijdelijke metabole acidose in het dier. De eenmalige toediening van 2 bolussen Bovikalc® Dry bij het droogzetten van een koe heeft een verminderde melkproductie aangetoond. De verminderde melkproductie vermindert de uierdruk en verhoogt daardoor de ligtijd van koeien.

Samenstelling: Calciumchloride, calciumsulfaat, mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur.

Toevoegingsmiddelen: *Vitaminen en pro vitaminen:* Vitamine D3 (3a671): 100.000 IU per kg; Vitamine E (3a700): 5.000 IU per kg. *Andere zoötechnische voedingsmiddelen:* Ammoniumchloride (4d8): 10,4%. *Spoorelementen:* Selenium-Se (E8): 12 mg per kg

Analytische bestanddelen: Calcium: 19,8%; Vocht: 30,3%. Bovikalc® Dry bevat geen natrium, fosfor of magnesium.

Toediening: Om te gebruiken bij melkkoeien bij het droogzetten. Geef 2 bolussen bij de laatste melkbeurt of 8-12 uur vóór de laatste melkbeurt. Dien niet meer dan 4 bolussen per 24 uur toe.

Voorzorgmaatregelen: Als de coating op de bolus beschadigd raakt of breekt, moet u de bolus niet toedienen.

Bewaren: Bewaren bij max. 30 °C. De bolus moet in de container bewaard worden tot onmiddellijk voor gebruik, omdat de bolus gevoelig is voor luchtvochtigheid. Ten minste houdbaar tot: zie "EXP" of (MM/YY).

Distributeur België
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA,
Avenue Arianelaan 16,
1200 Brussel/Bruxelles
HN100717

Fabrikant
Boehringer Ingelheim
208-R854833

Bovikalc® Dry is een geregistreerd handelsmerk van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - gebruikt onder licentie.

