

Canikur® Pro

Aliment complémentaire pour le soutien de la flore intestinale des chiens et chats.
Seringue de 15 ml ou 30 ml.

Destinés aux animaux

Aliment complémentaire pour le soutien de la flore intestinale naturelle des chiens et chats. Contient une souche de bactéries probiotiques naturellement présentes dans le tractus intestinal sain. Contient aussi du Bio-Mos®-C (prébiotique) qui soutient la croissance des bactéries utiles dans le tractus intestinal, et de la bentonite, un agent naturel adsorbant et thixotrope. Bio-Mos®-C est une marque commerciale d'Alltech, Inc.

Constituants analytiques

Protéines brutes	6,0%
Cellulose brute	1,5%
Huiles et matières grasses brutes	41,1%
Cendres brutes	21,1%
Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique	13,0%
<i>Enterococcus faecium</i>	5 x 10 ¹¹ UFC/par kg

Composition

Huile de soja, levure inactivée et composants, hydrolysate de protéine végétale (farine de lupin), glucose, chlorure de sodium, phosphate disodique, huile de tournesol

Additifs - Additifs technologiques

Enterococcus faecium (DSM 10663/ NCIMB 10415) (stabilisateur de la flore intestinale) : 2 x 10¹² UFC par kg, bentonite (1m558i; liant): 17 %. Information disponible chez le distributeur.

Dosage et administration

Chats:	1-2 ml deux fois par jour
Chiots, chiens petits (poids 10 kg et moins) :	2 ml deux fois par jour
Chiens de taille moyenne (11-25 kg) :	4 ml deux fois par jour
Chiens de grande taille (26-40 kg) :	6 ml deux fois par jour
Chiens XL (plus de 40 kg) :	8 ml deux fois par jour

Tournez l'anneau de la seringue jusqu'au dosage souhaité et poussez le piston pour faire sortir la pâte Canikur® Pro. Déposez-la sur la nourriture ou directement dans la gueule du chien ou chat. Tenez-vous à la dose recommandée. Après utilisation, il est recommandé de replacer le bouchon sur la seringue afin d'éviter que la pâte sèche. Utilisez aussi longtemps que nécessaire ou suivant les recommandations du vétérinaire (mais pas plus de 4 semaines) pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale pendant les périodes de stress, de traitement antibiotique ou toute autre période pendant laquelle la flore intestinale peut être dérégulée. Les antibiotiques du groupe des macrolides, administrés par voie orale, sont capturés par la bentonite et l'utilisation simultanée doit être évitée.

Conservation

Conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Distributeur

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Avenue Ariane 16,
1200 Bruxelles
HN100717

Fabricant

Boehringer Ingelheim
aGB2800019

N° de lot

Voir côté de la boîte

À utiliser de préférence avant

Voir "EXP MM/AA" sur le côté de la boîte

Canikur® Pro est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

